

AGA

MEDICINSK OXYGEN AGA 100%, medicinsk gas, komprimerad

Syrgas 100% (O₂)

Läs noga igenom denna bipacksedel.

Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Medicinsk Oxygen AGA måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Medicinsk Oxygen AGA är och vad det används för
2. Innan du använder Medicinsk Oxygen AGA
3. Hur du använder Medicinsk Oxygen AGA
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Medicinsk Oxygen AGA ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD MEDICINSK OXYGEN AGA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Medicinsk Oxygen AGA innehåller syrgas som används för inandning. Den är färg-, lukt- och smaklös och tillhandahålls i gasflaska som har en tryckregulator för att minska gasens tryck. Gasflaskan innehåller endast ren syrgas.

Medicinsk Oxygen AGA ökar innehållet av syre i blodet (ökad syremättnad). Medicinsk Oxygen AGA medför att mer syre transporteras ut till kroppens alla vävnader.

Medicinsk Oxygen AGA används

- för att behandla eller förebygga akut eller kronisk syrebrist.
- som en del av gasflödet vid narkos, smärtlindring och intensivvård.
- som drivgas för inandning av andra läkemedel (nebulisator-behandling).
- som första hjälpen-behandling med 100% syrgas vid dykarsjuka
- för behandling av akut attack av Hortons huvudvärk
- i tryckkammare för att minska risken för skador pga dykarsjuka, gas- eller luftbubblor i blodkärl och allvarlig kolmonoxidförgiftning, samt vid kallbrand.

2. INNAN DU ANVÄNDER MEDICINSK OXYGEN AGA

Om du personligen ordinerats Medicinsk Oxygen AGA bör du informera din läkare i händelse av:

- att du lider av kronisk lungsjukdom som t.ex. astma eller KOL.

Var särskilt försiktig med Medicinsk Oxygen AGA

- Om ditt spädbarn behöver extra syrgas och är för tidigt fött. Tillför endast den mängd syrgas som du blivit anvisad av din sjukvårdspersonal.
- Om du har ordinerats behandling i tryckkammare (hyperbar syrgasbehandling) ska risken kopplad till skador på lungsäcken (sk. pneumothorax) beaktas.

Användning av andra läkemedel

Tala om för din läkare om du använder eller har ordinerats bleomycin (mot cancersjukdom), amiodaron (mot hjärtsjukdom) eller furadantin eller liknande antibiotika (mot infektion), eftersom det finns en risk för skadliga effekter på lungorna.

Graviditet och amning

Medicinsk Oxygen AGA kan användas under graviditet.

Medicinsk Oxygen AGA kan användas vid amning.

Om du har ordinerats behandling i tryckkammare (hyperbar syrgasbehandling) så tala om för din läkare om du är gravid eller misstänker att du är gravid.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan köra efter användning av Medicinsk Oxygen AGA förutsatt att läkare anser att du är i stånd till det.

3. HUR DU ANVÄNDER MEDICINSK OXYGEN AGA

Om du personligen ordinerats Medicinsk Oxygen AGA, ändra inte på doseringen utan att först samråda med din läkare.

Medicinsk Oxygen AGA används för inhalation. Vanlig dos för vuxna för att behandla eller förebygga *akut syrebrist* är 3 – 4 liter per minut vid användning av näsgrimpa, eller 5 – 15 liter per minut med mask. För dosering i övriga fall rådgör med läkare.

Man andas vanligen Medicinsk Oxygen AGA genom en näsgrimpa eller mask. Antingen andas man själv – man "spontanandas" eller så får man hjälp att andas av en respirator/ventilator.

Läs noga bruksanvisningen/patientinstruktionen för aktuell andningsutrustning!

Om du använt för stor mängd av Medicinsk Oxygen AGA

I utsatta situationer kan för mycket Medicinsk Oxygen AGA påverka andningsfunktionen och i undantagsfall ge upphov till kolsyre-narkos/medvetslöshet.

Långvarig användning av för mycket Medicinsk Oxygen AGA kan ge smärta, torrhosta och även andfåddhet.

Om dessa tecken på överdosering uppträder kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Säkerhetsanvisningar

- Medicinsk Oxygen AGA är endast avsett för medicinskt bruk.
- Koppla endast flaskan till anslutning avsedd för medicinsk oxygen.
- Syrgasen (behållare och flaskor) skall endast användas i utrymmen med god ventilation.
- Gasflaskorna får inte utsättas för hög värme
- Rökning och öppen eld får inte förekomma i rum där Medicinsk Oxygen AGA används, eftersom det ökar risken för brand.
- Använd ej brödrost, hårfön eller liknande elektriska apparater under behandling med Medicinsk Oxygen AGA.
- Lägg aldrig en oxygenmask eller näsgrimpa direkt på textilier när behandling pågår – textilier som blivit syrgasmättade kan bli mycket lättantändliga/brandfarliga. Om detta ändå skulle inträffa skaka och vädra ur sådana textilier ordentligt.
- Stäng av utrustningen när den inte används.
- Vid brand – stäng av utrustningen.
- Gasflaskor ska föras i säkerhet vid brandfara.
- Använd aldrig fett, olja el dylikt för att smörja gängor som kärvar, eftersom det finns risk för självantändning i kontakt med Medicinsk Oxygen AGA under *högt tryck*.
- Tryckregulatorn skall öppnas långsamt och försiktigt.
- Hanteras varsamt. Se till att gasflaskan inte utsätts för stötar och fall.
- Håll flaskan ren och torr.
- Förvaras och transporteras med stängd ventil samt påsatt skyddspropp och kåpa, där sådan förekommer.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Medicinsk Oxygen AGA orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Vid behandling utanför sjukvårdsinrättning;

Medicinsk Oxygen AGA-behandling genom näsgrimpa kan pga att gasen är torr ge upphov till torra slemhinnor i näsa och mun.

Läs även avsnittet

”Om du använt för stor mängd av Medicinsk Oxygen AGA”

Vid behandling vid sjukvårdsinrättning;

Bieffekter ses vanligen vid hög koncentration (över 70 %) och efter längre tids behandling (minst 6 – 12 timmar).

Vanliga (fler än 1 av 100 användare):

- Inga

Mindre vanliga (färre än 1 av 100 användare):

- Smärta vid andning, torrhosta och andnöd

Hyperbar syrgasbehandling

- Tryckkänsla i mellanörat. Sprucken trumhinna

Sällsynta (färre än 1 av 1000 användare):

Hos nyfödda barn exponerade för höga syrgaskoncentrationer:

- Skada på ögat vilket kan leda till nedsatt syn.

Mycket sällsynta (färre än 1 av 10 000 användare):

- Allvarliga andningssvårigheter (akut andningssvikt)

Hyperbar syrgasbehandling

- Oro eller förvirring och epileptiska kramper.

5. HUR MEDICINSK OXYGEN AGA SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara flaskan på en väl ventilerad plats där den inte utsätts för stark värme.

Håll flaskan ren och torr.

Se till att gasflaskorna inte utsätts för stötar och fall.

Förvaras åtskilt från brännbara ämnen.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är oxygen (syrgas) 100%.
(Kemisk beteckning: O₂)

- Inga övriga innehållsämnen ingår i Medicinsk Oxygen AGA

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gasflaskans skuldra är märkt med vit färg för syre (oxygen).

Gasflaskans kropp är vit (medicinsk gas).

I Finland, kan gasflaskans kropp även vara turkos.

Förpacknings-storlekar i liter

1 • 1,1 • 1,2 • 2 • 2 x 2 • 2,5 • 3 • 4 • 4,7 • 5 • 6 • 10 • 15 • 20 • 21,3 • 50
2 x 21,3 • 10 x 50 • 12 x 50

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

AGA AB

SE-181 81 Lidingö

Sverige

Information lämnas av:

Linde Healthcare (division inom AGA AB). Tel: 08-731 10 00

Denna bipacksedel godkändes senast

2010-12-06

Information om detta läkemedel finns tillgängligt på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se



AGA Gas AB

Linde Healthcare, 181 81 Lidingö

Telefon 08-731 10 00, www.linde-healthcare.se